

Oppdatering av rapporten “Er kjønns-segregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?”

Notat fra Kunnskapsenteret
Systematisk litteratursøk
med sortering
Juni 2013

- Tittel** Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste
- English title** Update of the report “Is gender segregated substance abuse treatment the best thing for women with substance abuse?” – systematic literature search with sorted reference list
- Institusjon** Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
- Ansvarlig** Magne Nylenna, direktør
- Forfattere** Smedslund, Geir, prosjektleder, *seniorforsker, Kunnskapssenteret*
Steiro, Asbjørn, *forsker, Kunnskapssenteret*
Fure, Brynjar, seksjonsleder, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kirkehei, Ingvild, forskningsbibliotekar, Kunnskapssenteret
- ISBN** 978-82-8121-536-8
- Notat** Juni – 2013
- Prosjektnummer** 489
- Publikasjonstype** Systematisk litteratursøk med sortering
- Antall sider** 12 (17 inklusiv vedlegg)
- Oppdragsgiver** Helsedirektoratet
- Emneord(MeSH)** Substance-related disorders, Treatment Outcome, Female, Male
- Sitering** Smedslund G, Steiro A, Fure B, Kirkehei I. Update of the report “Is gender segregated substance abuse treatment the best thing for women with substance abuse?” – systematic literature search with sorted reference list. Notat 2013. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til gode beslutninger slik at brukerne får best mulig helsetjenester. Kunnskapssenteret er formelt et forvaltningsorgan under Helsedirektoratet, men har ingen myndighetsfunksjoner og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Oslo, juni 2013

Hovedfunn

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekten av kjønnssegregert rusbehandling. Rapporten inkluderte én systematisk oversikt av lav metodisk kvalitet som fant at kjønnssegregert behandling kan redusere frafall fra behandling og bedre den psykiske helsen, men resultatene må tolkes med forsiktighet.

Resultater

- Søket etter systematiske oversikter resulterte i totalt 857 referanser. Av disse var seks mulig relevante. Ved lesning av fulltekst ble ingen nye systematiske oversikter inkludert, men vi valgte å inkludere tre enkeltstudier.

Tittel:

Oppdatering av rapporten "Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?" – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Publikasjonstype:

Systematisk litteratursøk med sortering

Systematisk litteratursøk med sortering er resultatet av å

- søke etter relevant litteratur ifølge en søkestrategi og
- eventuelt sortere denne litteraturen i grupper presentert med referanser og vanligvis sammendrag

Svarer ikke på alt:

- Ingen kritisk vurdering av studienes kvalitet
- Ingen analyse eller sammenfatning av studiene
- Ingen anbefalinger

Hvem står bak denne publikasjonen?

Kunnskapssenteret har gjennomført oppdraget etter forespørsel fra Helsedirektoratet

Når ble litteratursøket utført?

Søk etter studier ble avsluttet i desember 2012.

Key messages

The Norwegian Health Directorate commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services to conduct a systematic literature search with subsequent sorting of relevant publications. The task was to identify new studies published after the Knowledge Centre's report from 2009 about the effect of gender-segregated treatment for substance abuse. The report included one systematic review of low methodological quality which found that gender-segregated treatment can reduce attrition from treatment and improve mental health, but the results must be interpreted with caution.

Results

- The search for systematic reviews resulted in a total of 857 references. Six were considered possibly relevant. After full text reading, no new systematic reviews were included, but we chose to include three single studies.

Title:

Update of the report "Is gender segregated substance abuse treatment the best thing for women with substance abuse?" – systematic literature search with sorted reference list

Type of publication:

Systematic reference list

A systematic reference list is the result of a search for relevant literature according to a specific search strategy. The references resulting from the search are then grouped and presented with their abstracts.

Doesn't answer everything:

- No critical evaluation of study quality
 - No analysis or synthesis of the studies
 - No recommendations
-

Publisher:

Norwegian Knowledge Centre for the Health Services

Updated:

Last search for studies: December 2012.

Innhold

HOVEDFUNN	2
KEY MESSAGES	3
INNHold	4
FORORD	5
INNLEDNING	6
Styrker og svakheter ved litteratursøk med sortering	6
Begrunnelse for valg av søkestrategi	6
Problemstilling	6
METODE	7
Litteratursøking	7
Inklusjonskriterier	7
Artikkelutvelging	8
RESULTAT	9
Resultat av søk	9
BESKRIVELSE AV DE INKLUDERTE STUDIENE	10
REFERANSELISTE	12
VEDLEGG	13
Vedlegg 1 Søkestrategier	13

Forord

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Brittelise Bakstad i Helsedirektoratet, leder for *Nasjonalt faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere* å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekten av kjønnssegregert rusbehandling (1). Vi valgte å løse oppdraget som et litteratursøk med sortert referanseliste. Litteraturen i vår referanseliste kan utgjøre et relevant dokumentasjonsgrunnlag for de nye nasjonale retningslinjene.

Prosjektgruppen har bestått av:

- Geir Smedslund, seniorforsker, Kunnskapssenteret
- Asbjørn Steiro, forsker, Kunnskapssenteret
- Ingvild Kirkehei, bibliotekar, Kunnskapssenteret

Gro Jamtvedt
Avdelingsdirektør

Brynjar Fure
Seksjonsleder

Geir Smedslund
Prosjektleder

Innledning

Styrker og svakheter ved litteratursøk med sortering

Ved litteratursøk gjennomfører vi systematiske litteratursøk for en gitt problemstilling. Resultatene fra søket blir i sin helhet overlevert oppdragsgiver, eller vi kan gjennomgå søkeresultatet før overleveringen og sortere ut ikke-relevante artikler. Dette gjøres basert på tittel og eventuelt sammendrag. Artiklene innhentes vanligvis ikke i fulltekst, men i dette tilfellet valgte vi å innhente noen artikler i fulltekst for å vurdere relevans. Vi benytter kun databaser for identifisering av litteratur og kan derfor ha gått glipp av potensielt relevante studier. Andre måter å identifisere studier på, som søk i referanselister, kontakt med eksperter på fagfeltet og upublisert litteratur, er ikke utført i dette oppdraget. Vi gjennomfører ingen kvalitetsvurdering av artiklene.

Ved en full forskningsoppsummering ville vi ha innhentet artiklene i fulltekst for endelig vurdering opp mot inklusjonskriteriene. Inkluderte studier ville så blitt kvalitetsvurdert i henhold til våre sjekklister og resultater sammenstilt og diskutert.

Begrunnelse for valg av søkestrategi

Vi har søkt i elektroniske kilder, men ikke etter grå litteratur eller liknende. Søket er gjort for tidsperioden etter at Kunnskapssenterets rapport ble publisert (2009). I søkene er det ikke lagt på filter for å begrense til spesielle studiedesign.

Problemstilling

I prosjektet har vi søkt etter litteratur som skal belyse problemstillinger knyttet til effekten av kjønnssegregert rusbehandling for kvinner med rusavhengighet.

Metode

Litteratursøking

Vi søkte systematisk etter litteratur i følgende databaser slik det ble gjort i Kunnskapssenterets rapport fra 2009:

- Embase
- Medline
- Cochrane Library
- CRD
- PsycINFO

Embase og CRD ble ikke søkt i forbindelse med Kunnskapssenterets rapport fra 2009.

Forskningsbibliotekar Ingvild Kirkehei planla og utførte samtlige søk. Den fullstendige søkestrategien er gitt ut i vedlegg til denne rapporten. Søk etter studier ble avsluttet desember 2012.

Inklusjonskriterier

Populasjon:	Kvinner med rusavhengighet
Tiltak:	Rusbehandling for bare kvinnelige deltakere
Sammenlikning:	Rusbehandling i kjønnsblandede grupper
Utfall:	Hovedutfallsmål: rusmiddelbruk. Sekundære utfallsmålinger på: frafall, tilfredshet, kostnad. Målene inkluderes uavhengig av om de er rapportert som kontinuerlige eller dikotome størrelser og uavhengig av om de er basert på selvrapporterte data, registermateriale, pårørende informasjon eller data fra behandlerne
Studiedesign	Systematiske oversikter
Språk:	Alle

Artikkelutvelging

To forskere (GS og AS) gikk gjennom alle titler og sammendrag for å vurdere relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Vurderingene gjorde de uavhengig av hverandre og sammenlignet i etterkant. Der det var uenighet om vurderingene, ble inklusjon eller eksklusjon avgjort ved konsensus.


Utvelging av litteratur ble hovedsaklig gjort basert på tittel og sammendrag. Vi bestilte fulltekst av artiklene i noen få tilfeller der vi var usikre på relevans basert på tittel og sammendrag.

Resultat

Resultat av søk

Søket resulterte i 1221 referanser. Etter dublett kontroll satt vi igjen med 857 referanser. Vi vurderte 6 av de identifiserte referansene til å være mulig relevante i henhold til inklusjonskriteriene. Vi fant ingen nye systematiske oversikter, men tre enkeltstudier (2-4) ble inkludert etter vurdering av fulltekster. En bok (5), og to oversikter (6;7) ble ekskludert (se tabell over ekskluderte oversikter i vedlegg).

Hovedårsaken til eksklusjon var at sammenlikningen ikke var mellom behandling bare for kvinner og behandling for grupper av begge kjønn.



Figur 1. Flytskjema over identifisert litteratur

Beskrivelse av de inkluderte studiene

Gjestad (4) sammenliknet mortaliteten hos kvinnelige alkoholikere som ble randomisert til en gruppe med bare kvinner (n = 100) eller til en gruppe med både menn og kvinner (treatment as usual eller TAU, n = 100). Kvinneprogrammet ble kalt "Early treatment for women with Alcohol Addiction (EWA)". Oppfølgingen ble foretatt med personlig intervju etter to år og via dødsårsaksregisteret etter inntil 27 år. Det ble kontrollert for alder, behandlingsstatus (inneliggende eller poliklinisk) og 2-års drikkeatferd. Gjestad og medarbeidere rapporterte signifikant lavere mortalitet blant yngre kvinner som hadde blitt randomisert til EWA sammenliknet med dem som fikk TAU. Denne forskjellen holdt seg i nesten 20 år etter inntak til behandling. For kvinner som bare trengte poliklinisk behandling ble det funnet redusert mortalitet også for eldre kvinner.

Greenfield (2) har gjort en liknende randomisert studie som Gjestad. Men her var utfallet rusbruk (både alkohol og andre stoffer). De fant ingen signifikante forskjeller i rusbruk i løpet av de 12 ukene hvor behandlingen foregikk. Men ved 6 måneders oppfølgingen hadde deltakerne i kvinnegruppen redusert sin rusbruk mens de som hadde deltatt i gruppen med både menn og kvinner ikke hadde redusert sin rusbruk. Selv om tilfredsheten med gruppene var høy i begge betingelser, var kvinnene i kvinnegruppen mer fornøyd med behandlingen.

Den tredje inkluderte studien av Prendergast (3) var ikke randomisert, men den sammenliknet også kvinner som fikk behandling i rene kvinnegrupper (n = 135) med kvinner som gikk i grupper med begge kjønn (n = 124). Ved ett års oppfølging ble følgende undersøkt: narkotika- og alkoholbruk, kriminell aktivitet, arrestasjoner, og deltakelse i arbeid. I begge gruppene viste kvinnene bedring på alle fire utfallsmålene. Kvinnegruppene gjorde det signifikant bedre enn de kjønnsblandede gruppene i forhold til rusbruk og kriminalitet, mens det ikke var signifikant forskjell mellom gruppene når det gjaldt arrestasjoner eller deltakelse i arbeid.

For øvrig viser vi til Kunnskapssenterets opprinnelige rapport (1)
(<http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Er+kj%C3%B8nnssegregert+rus+behandling+det+beste+for+rusavhengige+kvinner%3F.5951.cms>)

Referanseliste

1. Dalsbø T, Steiro A, Høie B. Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner? Notat. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2009.
2. Greenfield SF, Trucco EM, McHugh RK, Lincoln M, Gallop RJ. The Women's Recovery Group Study: a Stage I trial of women-focused group therapy for substance use disorders versus mixed-gender group drug counseling. *Drug Alcohol Depend* 2007;90(1):39-47.
3. Prendergast ML, Messina NP, Hall EA, Warda U.S. The relative effectiveness of women-only and mixed-gender treatment for substance-abusing women. *J Subst Abuse Treat* 2011;40(4):336-48.
4. Gjestad R, Franck J, Lindberg S, Haver B. Early Treatment for Women with Alcohol Addiction (EWA) reduces mortality: a randomized controlled trial with long-term register follow-up. *Alcohol Alcohol* 2011;46(2):170-6.
5. Greenfield SF, Pirard S. Gender-specific treatment for women with substance use disorders. *A comprehensive handbook*; 2009.
6. Adams S, Leultefeld CG, Peden AR. Substance abuse treatment for women offenders: A research review. *Journal of Addictions Nursing* 2008;19(2):61-75.
7. Fowler DN, Faulkner M. Interventions targeting substance abuse among women survivors of intimate partner abuse: a meta-analysis. *J Subst Abuse Treat* 2011;41(4):386-98.

Vedlegg

Vedlegg 1 Søkestrategier

Søkestrategi kjønnssegrerert rusbehandling

Oppdatert søk 19.12.2012

Søket er en oppdatering av søk utført i desember 2008.

Det er gjort noen endringer i søkefilter for systematiske oversikter. I tillegg er det lagt til søkeord for menn.

Søketreff totalt: 1221. 857 etter dublettkontroll.

Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present

Søketreff: 500

1. Alcoholism/
2. Alcohol Drinking/
3. alcoholi\$.tw.
4. (alcohol adj3 (abus\$ or use\$ or drink\$ or consumption\$)).tw.
5. or/1-4
6. substance-related disorders/ or amphetamine-related disorders/ or cocaine-related disorders/ or marijuana abuse/ or exp opioid-related disorders/ or phencyclidine abuse/
7. ((drug\$ or substance\$ or alcohol\$) adj3 (abuse\$ or dependen\$ or addiction\$ or disorder\$)).tw.
8. ((narcotic\$ or opiate\$ or opioid\$ or amphetamine or cocaine or marijuana or phencyclidine) adj3 (abuse\$ or use\$ or addiction\$ or dependen\$ or disorder\$)).tw.
9. or/6-8
10. 5 or 9
11. Treatment Outcome/
12. (therapy or rehabilitation).fs.
13. (treatment\$ or therap\$ or rehabilitat\$).tw.
14. or/11-13
15. 10 and 14
16. female/ or male/ or women/ or men/ or sex factors/ or sex/
17. (female\$1 or gender or sex or wom#n\$ or men\$1 or man\$1 or male\$1).tw.
18. 16 or 17
19. 15 and 18
20. Meta analysis.pt. or meta-analysis.tw.
21. ((systematic* or comprehensive or literature or quantitative or critical or integrative or evidence\$) adj2 (review\$1 or overview\$ 1)).tw.
22. (pubmed or medline or embase).tw.
23. (selection criteria or data extraction).ab. and review.pt.
24. literature review.tw.

25. ((comprehensive* or systematic* or electronic or database*) adj2 search*).tw.
26. or/20-25
27. 19 and 26
28. animal/ not human/
29. 27 not 28
30. (200812* or 2009* or 2010* or 2011* or 2012*).ed,dp,yr.
31. 29 and 30

Embase 1980 to 2012 Week 50

Søketreff: 396

1. alcoholism/
2. alcoholi\$.tw.
3. (alcohol adj3 (abus\$ or use\$ or drink\$ or consumption\$)).tw.
4. addiction/ or exp drug dependence/
5. ((drug\$ or substance\$ or alcohol\$) adj3 (abuse\$ or dependen\$ or addiction\$ or disorder\$)).tw.
6. ((narcotic\$ or opiate\$ or opioid\$ or amphetamine or cocaine or marijuana or phencyclidine) adj3 (abuse\$ or use\$ or addiction\$ or dependen\$ or disorder\$)).tw.
7. or/1-6
8. treatment outcome/
9. rh.fs.
10. th.fs.
11. (treatment\$ or therap\$ or rehabilitat\$).tw.
12. or/8-11
13. 7 and 12
14. *female/
15. *male/
16. *gender/
17. *sex/ or sex allocation/
18. (female\$1 or gender or sex or wom#n\$ or men\$1 or man\$1 or male\$1).tw.
19. or/14-18
20. 13 and 19
21. ((systematic* or comprehensive or literature or quantitative or critical or integrative or evidence\$) adj2 (review\$1 or overview\$ 1)).tw. or meta-analysis.mp. or (pubmed or medline).tw. or ((comprehensive* or systematic* or electronic or database*) adj2 search*).tw. or literature review.tw.
22. 20 and 21
23. (2009* or 2010* or 2011* or 2012*).dd,dp,yr.
24. 22 and 23
25. limit 24 to embase
26. animal/ not human/
27. 25 not 26

PsycINFO 1806 to December Week 2 2012

Søketreff: 207

1. Alcohol Abuse/ or Alcoholism/
2. alcoholi\$.tw.
3. (alcohol adj3 (abus\$ or use\$ or drink\$ or consumption\$)).tw.
4. or/1-3
5. drug abuse/ or exp drug dependency/ or exp inhalant abuse/ or polydrug abuse/
6. ((drug\$ or substance\$ or alcohol\$) adj3 (abuse\$ or dependen\$ or addiction\$ or disorder\$ or use\$)).tw.

7. ((narcotic\$ or opiate\$ or opioid\$ or heroin or amphetamine or cocaine or marijuana or phencyclidine or inhalant or polydrug) adj3 (abuse\$ or addiction\$ or dependen\$ or disorder\$ or use\$)).tw.
8. or/5-7
9. 4 or 8
10. treatment compliance/ or exp drug rehabilitation/ or treatment/
11. (treatment\$ or therap\$ or rehabilitat\$).tw.
12. or/10-11
13. 9 and 12
14. exp single sex environments/
15. Human Sex Differences/
16. exp human females/
17. female attitudes/
18. exp human males/
19. Male Attitudes/
20. (female\$1 or male\$1 or gender or sex or wom#n\$ or men\$1 or man\$1).tw.
21. or/14-20
22. 13 and 21
23. "literature review"/ or meta analysis/
24. ((systematic* or comprehensive or literature or quantitative or critical or integrative or evidence\$) adj2 (review\$1 or overview\$ 1)).tw.
25. literature study.tw.
26. (cochrane or embase or medline or pubmed).tw.
27. ((systematic* or electronic or database* or comprehensive*) adj2 search*).tw.
28. (selection criteria or data extraction).ab. and review.mp.
29. or/23-28
30. 22 and 29
31. (200812* or 2009* or 2010* or 2011* or 2012*).up,dp,yr.
32. 30 and 31
33. (animal not human).po.
34. 32 not 33

Cochrane Library, 2012 Issue 12

Søketreff: Systematic Reviews 70, DARE 21, HTA 1

- #1 MeSH descriptor: [Alcoholism] explode all trees
- #2 MeSH descriptor: [Alcohol Drinking] explode all trees
- #3 alcoholi*:ti,ab,kw
- #4 (alcohol near/3 (abus* or use* or drink* or consumption*)):ti,ab,kw
- #5 (#1 or #2 or #3 or #4)
- #6 MeSH descriptor: [Substance-Related Disorders] this term only
- #7 MeSH descriptor: [Amphetamine-Related Disorders] explode all trees
- #8 MeSH descriptor: [Cocaine-Related Disorders] explode all trees
- #9 MeSH descriptor: [Marijuana Abuse] explode all trees
- #10 MeSH descriptor: [Opioid-Related Disorders] explode all trees
- #11 MeSH descriptor: [Phencyclidine Abuse] explode all trees
- #12 ((drug* or substance* or alcohol*) near/3 (abuse* or dependen* or addiction* or disorder*)):ti,ab,kw
- #13 ((narcotic* or opiate* or opioid* or amphetamine or cocaine or marijuana or phencyclidine) near/3 (abuse* or use* or addiction* or dependen* or disorder*)):ti,ab,kw
- #14 (#6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13)
- #15 #5 or #14
- #16 MeSH descriptor: [Treatment Outcome] this term only
- #17 Any MeSH descriptor with qualifier(s): [Therapy - TH]
- #18 Any MeSH descriptor with qualifier(s): [Rehabilitation - RH]

- #19 (treatment* or therap* or rehabilitat*):ti,ab,kw
- #20 #16 or #17 or #18 or #19
- #21 #15 and #20
- #22 MeSH descriptor: [Women] this term only
- #23 MeSH descriptor: [Sex Factors] explode all trees
- #24 MeSH descriptor: [Sex] explode all trees
- #25 MeSH descriptor: [Men] this term only
- #26 MeSH descriptor: [Female] explode all trees
- #27 MeSH descriptor: [Male] explode all trees
- #28 (female* or male or males or gender or sex or woman or women or man or men):ti,ab,kw
- #29 #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28
- #30 #21 and #29 from 2008 to 2012

CRD Databases (DARE, HTA)

Søk avgrenset til publikasjonsår 2011-2012 fordi DARE og HTA også er søkt i Cochrane Library.

Søketreff: 26

- 1 MeSH DESCRIPTOR Alcoholism EXPLODE ALL TREES
- 2 MeSH DESCRIPTOR Alcohol Drinking EXPLODE ALL TREES
- 3 (alcoholi*):TI
- 4 ((alcohol and (abus* or use* or drink* or consumption*)):TI
- 5 #1 OR #2 OR #3 OR #4
- 6 MeSH DESCRIPTOR Substance-Related Disorders EXPLODE ALL TREES
- 7 (((drug* or substance* or alcohol*) and (abuse* or dependen* or addiction* or disorder*)):TI
- 8 (((narcotic* or opiate* or opioid* or amphetamine or cocaine or marijuana or phencyclidine) and (abuse* or use* or addiction* or dependen* or disorder*)):TI
- 9 #6 OR #7 OR #8
- 10 #5 OR #9
- 11 MeSH DESCRIPTOR Treatment Outcome EXPLODE ALL TREES
- 12 ((treatment* or therap* or rehabilitat*):)
- 13 #11 OR #12
- 14 #10 AND #13
- 15 MeSH DESCRIPTOR Women EXPLODE ALL TREES
- 16 MeSH DESCRIPTOR Sex Factors EXPLODE ALL TREES
- 17 MeSH DESCRIPTOR Sex EXPLODE ALL TREES
- 18 MeSH DESCRIPTOR Men EXPLODE ALL TREES
- 19 MeSH DESCRIPTOR Female EXPLODE ALL TREES
- 20 MeSH DESCRIPTOR Male EXPLODE ALL TREES
- 21 (female* or male or males or gender or sex or woman or women or man or men)
- 22 #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21
- 23 #14 AND #22

Vedlegg 2 Tabell over ekskluderte oversikter

Adams S, Leultefeld CG, Peden AR. Substance abuse treatment for women offenders: A research review. <i>Journal of Addictions Nursing</i> 2008;19(2):61-75.	Feil sammenlikning
Fowler DN, Faulkner M. Interventions targeting substance abuse among women survivors of intimate partner abuse: a meta-analysis. <i>J Subst Abuse Treat</i> 2011;41(4):386-98.	Feil sammenlikning
Greenfield SF, Pirard S. Gender-specific treatment for women with substance use disorders. <i>A comprehensive handbook</i> ; 2009.	Inneholder det samme som en tidligere inkludert oversikt.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Postboks 7004, St. Olavs plass
N-0130 Oslo
(+47) 23 25 50 00
www.kunnskapssenteret.no
Notat: ISBN 978-82-8121-536-8

juni 2013

 kunnskapssenteret